

Sortie ornithologique LHS du
12 mai 2018, à Maincourt-sur-
Yvette et Lévis-Saint-Nom,
guidée par Pierre Delbove.



Lathrée clandestine à Maincourt en avril 2008



Pierre arrive à un total de 42 espèces d'oiseaux, dont le Faucon crécerelle vu in fine en voiture sur le retour... C'est vraiment très bien, comme bilan.

Nous avons visité essentiellement 2 milieux: La zone humide de Maincourt-sur-Yvette, avec une belle observation d'un oiseau caractéristique des roselières, la rousserole effarvate, et aussi le coucou gris en vol, puis le plateau de Lévis-Saint-Nom, ses haies et sa friche.(Voir plus loin)

Les absents, dommage, pas de chance, ou problème météo/climato du printemps.


{Notons qu'il aura même neigé ce jour au-dessus de 800m en Lozère, en Ardèche, dans le Cantal, et en Haute-Loire, étonnant} : Epervier d'Europe, Râle d'eau (c'est l'oiseau patrimonial emblématique de Maincourt, on aurait dû l'entendre, normalement), Tourterelle des bois, Pic vert, Pic noir, Hirondelle de fenêtre, Pipit farlouse, Grive draine, Rougequeue noir, Rossignol philomèle, Accenteur mouchet, Rousserolle verderolle, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Roitelet à triple bandeau, Gobemouche gris, Mésange nonnette, Lorient d'Europe, Verdier d'Europe, Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Serin cini, Bruant des roseaux, Bruant zizi.

Donc, les conditions étaient peu propices aux oiseaux insectivores, ainsi qu'aux migrants au long cours comme le lorient, le rossignol, etc.

*Les présents (dans l'ordre systématique) : Héron cendré, Bernache du Canada, Canard colvert, Buse variable, **Bondrée apivore**, Faucon crécerelle, Faisan de Colchide, Gallinule poule d'eau, Mouette rieuse, Pigeon ramier, Tourterelle turque, **Coucou gris**, Pic épeiche, Alouette des champs, Hirondelle rustique, Bergeronnette grise, Troglodyte mignon, Rougegorge familier, **Tarier pâtre**, Merle noir, Grive musicienne, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, **Rousserolle effarvate**, **Hypolaïs polyglotte**, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Mésange à longue queue, Sittelle torchepot,*

Grimpereau des jardins, Pie bavarde, Geai des chênes, Choucas des tours, Corneille noire, Etourneau sansonnet, Moineau domestique, Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, Bruant jaune.
On ajoute la Grenouille rieuse, la Grenouille verte, et la Libellule déprimée, un hanneton en vol, les chrysomèles de l'aulne pour les autres animaux.

Mentionnons aussi l'existence d'une 43e espèce, avec un oiseau mystère sur la friche/prairie du plateau, vu en vol et atterrir pour s'y cacher. Pierre pense qu'il s'agirait sans nul doute possible, d'un **Oedicnème criard**.





*Rousserolle effarvate, nourrissant
un poussin coucou gris.*

*Tous les détails dans le journal
« La Hulotte » n°39*

Tarier pâtre

*Dans la friche ou les haies
du plateau de Lévis-Saint-Nom*



Hypolais polyglotte



Fauvette grisette



Bruant jaune

+ *La chrysomèle de l'aulne, dans le marais.*



En phase de reproduction l'abdomen des femelles est fortement distendu par les oeufs, et sa coloration jaune devient alors très visible.



La chrysomèle de l'aulne



Grenouille rieuse

**Quelques plantes remarquables observées lors de la sortie
ornithologique LHS du 12 mai 2018, à Maincourt-sur-Yvette :**

Marais

Toutes en fleurs :

Cardamine amara AR *

Ranunculus sceleratus

Veronica beccabunga

Viburnum opulus

Carex paniculata PC

Equisetum fluviatile AR

Zanichellia palustris PC

Eglise et plateau de Lévis-Saint-Nom

Forêt (Toutes en fleurs)

Saxifraga granulata PC

Veronica montana PC

Plateau/Friche (Toutes en fleurs)

Lathyrus nissolia AR en Essonne, R en IDF

Veronica serpyllifolia

Alopecurus pratensis

* Pour des explications détaillées sur le degré de rareté régionale, voir
Flore d'Ile-de-France (Jauzein, Nawrot) p60-61

Veronica beccabunga

L'étymologie de cet étrange nom d'espèce, beccabunga, est incertaine. Becca viendrait certainement du vieil allemand : ruisseau. (Et pensons au Bec normand qui vient du norrois bekkr !)
Bunga est plus mystérieux, piquant à cause de son goût; ou bouquet?
Donc la plante piquante des ruisseaux ou le bouquet des ruisseaux?
D'autres hypothèses existent...

Ranunculus sceleratus

Cette espèce ne porte pas son nom pour rien. Dangereuse pour le bétail, celle qu'on appelait « Céleri du rire » au Moyen Age, car les feuilles basales sont trompeuses, provoque chez l'être humain qui l'ingère un sourire forcé dû à la contraction de la bouche, involontaire et l'empoisonne.
On appelait cette plante Sardonia autrefois, d'où le sourire sardonique.
Ranunculus sardous ne doit guère valoir mieux



Ranunculus sceleratus



Zanichellia palustris, une potamogetonacée graminiforme, dans la mare aux grenouilles



Viburnum opulus, les fleurs extérieures du corymbe sont grandes et stériles.
Dans la variété « Boule de neige » horticoles, presque toutes les fleurs sont stériles.



Carex riparia



Cardamine amara , aux anthères violacées



Cardamine amara , aux anthères violacées



Equisetum fluviatile , les strobiles (Epis sporifères) se trouvent au sommet de tiges vertes, semblables aux tiges stériles d'*Equisetum pratense*, par exemple.



Equisetum fluviatile



*Notre chemin d'observation que nous avons rebaptisé
Le chemin du « magicien », eu égard à l'ambiance.*



Alopecurus pratensis





Lathyrus nissolia, une belle station découverte par Pierre dans la friche, tandis qu'il tentait de retrouver l'oedicnème criard.



Lathyrus nissolia



Veronica serpyllifolia



Veronica serpyllifolia



Crataegus monogyna, version rosée du chemin du « magicien ».



Crataegus monogyna